

Paris 6-
Aust-1777

1
Memoire sur la cure radicale des hernies, avec
des remarques sur les étranglemens de l'
intestin -

n° 122.

- Par M.^r Nannoni le fils -



Les descentes sont les maladies les
plus intéressantes de la Chirurgie, en
égard à la personne qui en est atteinte,
et à celui qui les doit traiter -

Les Chirurgiens n'ont pas omis
dans tous les siècles de procurer du soulage-
ment au malade, qui outre l'incommode-
dité qu'il en ressent, il est très souvent
exposé au danger de perdre la vie

On a proposé beaucoup de
moyens pour parvenir à la cure radicale
des descentes, mais la plus part sont
dangereuse, et même insuffisants -

La castration a joué le plus grand
rôle aux yeux de ceux qui se sont adonnés à
l'exercice de cette partie de la Chirurgie,
sans avoir d'ailleurs les connoissances
requises pour bien l'exercer - La facilité

ARC 15 d. 11 n° 1

avec laquelle on l'exécute en a été l'objet principal. Les praticiens les plus instruits n'ont point suivie cette methode, qu'on peut regarder comme meurtrière outre les dangers, puisque elle enleve inutilement une partie très essentielle à la génération, qui peut cependant se faire avec un seul testicule.

On a été contraint d'abandonner les cauterés actuels, et potentiels proposés, et mis en usage pour la cure radicale des hernies, à cause des accidents qu'ils peuvent produire au cordon spermatique, et du défaut du succès.

Le danger des caustiques a été bien exposé par le célèbre Académicien M.^r Bordenave dans son Memoire &c.

Le point doré, et la suture royale n'ont pas même eu beaucoup de partisans par des raisons à peu près égales à celles des caustiques. On a aussi essayé les toniques, les spiritiques &c. mais leur succès est dû

principalement au bandage, qu'on emploie
en même tems. La cure radicale de la
hernie n'est parfaite, que lorsqu'elle est
herniaire est oblitérée, ou au moins après
réparée pour empêcher la sortie de l'
intestin. Les parois de ce sac restant en
contact ~~en~~ continuellement en contact par le
moyen du brayer, s'attachent souvent
surtout dans les enfants, et dans les
hernies récentes, mais si elle est très-
étendue, on en obtient rarement la
guérison - C'est alors qu'il faut avoir
recours à des moyens plus efficaces -

Plusieurs Auteurs en parlant
de la cure radicale des hernies, ont
fait mention de la ligature du sac ~~herni-~~
herniaire - Le succès de cette opération
en doit prouver l'utilité -

Mon Père a obtenu depuis
long tems la cure radicale ~~de la hernie~~
par la ligature du sac herniaire, soit
dans l'hôpital Royal de Sainte Marie
à Florence, soit ailleurs - J'ai
exécutée aussi plusieurs fois cette



opération, et nous avons ainsi délivrés
de la hernie plusieurs personnes, qui ne
pourroient pas vaquer à leurs affaires
à cause du volume de la hernie, et de la
difficulté de la contenir par le moyen du
brazier - Voici comme nous la pratiquons.

On place, ~~le malade~~ et on assujétit le
malade comme dans l'opération de la
hernie, et après avoir réduit les parties,
qu'un aide empêche de ressortir, l'opérateur
fait un pli aux tegumens qu'il incise
obliquement depuis un travers de doigt
au dessus de l'anneau, jusque au dessous
des sac herniaire, qu'on dégage ensuite
des parties voisines. Lors-qu'on l'a isolé,
on en fait la ligature la plus serrée qu'on
peut de l'anneau, après être assuré,
qu'il ne contient plus d'intestin. S'il
contient de l'épiploon, et qu'il lui soit ~~adhérent~~
adhérent, on peut le comprimer immu-
nement dans la ligature, comme on a
fait plusieurs fois. On coupe ensuite le
sac un pouce au dessus de la ligature.
Onpanse la plaie avec la ~~charpie~~ charpie, et
on

on met un bandage convenable. Cette plaie
s'enfle. La fièvre survient avec elle son
le jour même de l'opération. Le malade
a des nausées, et vomit quelquefois. On leve
le premier appareil le troisième, ou le
quatrième jour, et même plutôt suivant
que la suppuration est plus, ou moins abon-
dante. Il survient souvent un abcès au
scrotum, qui se guérit aisement, soit
qu'il se perçe, ou qu'on l'ait ouvert. La
ligature du sac tombe ordinairement vers
le douzième jour, et le malade guérit
au bout de quarante, ou cinquante jours, à
moins qu'il ne survienne quelque accident
extraordinaire.

Je pourrois citer un nombre
de personnes de toute âge, et de tout sexe
guéries radicalement par cette méthode,
qui est moins dangereuse dans les femmes
à cause des parties qui avoisinent le
sac herniaire.

Si l'intestin est adhérent au
sac herniaire, il faut ouvrir le sac, en
détacher l'intestin, qu'on replacera,
et on finit l'opération comme on vient
de le dire.



Obs-1 = Le 24-May-1774 - j'opérai dans l'hôpital
de Sainte Marie Neuve un garçon âgé
de dix ans, dont la hernie ne rendroit
pas entièrement. Ayant ouvert le
sac, j'y trouvai l'intestin adhérent, après
l'avoir détaché, je le remis à sa place
avec beaucoup de peine à cause des
cris du malade qui le repoussoit
au dehors. Ayant détaché ~~le~~ ~~sac~~, et
lié le sac herniaire, le malade guérit
parfaitement ainsi qu'un autre garçon,
que j'opérai le même jour -

On a aussi lié plusieurs fois le
sac herniaire dans l'opération de la
hernie avec étranglement, et si l'on
a pas toujours lié le sac herniaire,
c'est plutôt pour abréger l'opération
que pour prévenir les accidents -

Obs-2 = Le 20-Juillet 1771 - mon Père, et moi
fûmes appelés pour voir un enfant
de 18-mois, attaqué depuis trois jours
d'une hernie avec étranglement.
La couleur rouge de la tumeur, les...

4
douleurs, que le malade indiquoit dans l'abdomen,
le hoquet, le vomissement, la petitesse, et la
fréquence du pouls, annonçoient une inflam-
mation produite par l'étranglement de l'
intestin. On proposa l'opération, quoique très
douteuse à cause de l'état du malade. Les
parents y ayant consenti, on fit transporter
le malade à l'hôpital, parce que il ne
pouvoit pas se procurer les secours...
nécessaires. Je fis l'opération. Le sac her-
niaire ne contenoit presque point d'eau.
L'intestin étoit d'une couleur noirâtre.
L'anneau étoit fort serré, et après l'
avoir incisé, je remis l'intestin à sa
place, et je liai le sac herniaire comme
dans les autres cas. Les parents du malade
le ramenerent chez eux. Le lendemain
j'allai le voir. Je le trouvai beaucoup
soulagé. Il étoit allé à la selle plusieurs
fois. L'abdomen étoit désenflé, sans
douleur. Le pouls étoit dans un meilleur
état. Le troisième jour je découvris pour
la première fois la plaie qui étoit rouge.
Le dixième la ligature tomba, et le



Semains après, le malade étoit parfaitement
guéri. On pourroit m'objecter, que dans ce
malade ainsi, que dans ceux, dont on a
lié le sac herniaire à l'occasion d'une hernie
avec étranglement, l'intestin pourroit
s'ulcérer, ou se gangréner, et que l'oblité-
ration du sac augmenteroit les accidens,
mais cela ~~ne~~ n'est point arrivé, et s'il
arrivoit, on pourroit donner issue aux
matières en coupant la ligature, et
même en pratiquant une ouverture,
si les matières ne se l'étoient pas procurées.

M. Le-Dran dans son traité d'
opérations de Chirurgie conseille d'em-
porter les côtes du sac herniaire, ce
qui est absolument inutile dans les petites
hernies, et peut-être même dans les
grandes.

Examinons à présent les raisons
de préférence de la ligature sur l'incision
du sac herniaire dans la cure radicale
des hernies. Les avantages de l'incision
consistent principalement dans la
facilité de la pratiquer, dans la prom-
ptitude, et dans le moins de douleur, qu'elle

cause. Mais notre but principal étant
d'obtenir la cure radicale de la hernie,
voyons si l'incision est aussi efficace, que
la ligature. On a observé, que la ~~ligature~~
pluspart de ceux aux quels on a incisé le
sac herniaire dans les hernies avec étran-
glements, sont récidivés, au lieu, que la
ligature produit une cicatrice assez
forte pour s'opposer à la sortie des
parties. Si parmi le grand nombre des
malades opérés par la ligature du sac
herniaire, quelques uns ont été sujets
aux hernies, ce nombre n'est égal pas à
beaucoup près celui des personnes aux
quelles on a fait l'incision. La difficulté
de détacher le sac herniaire, surtout
dans les hernies anciennes, est une
autre objection, qu'on peut faire à la
ligature, mais je puis assurer d'après
ma propre expérience, et celle de mon
Père, que dans ces hernies, il est
toujours possible de détacher le sac.
Au premier coup d'oeil l'incision
paroit moins dangereuse, que la ligature



mais l'expérience m'a convaincu, que cette dernière ~~est~~ ne produit ordinairement aucun accident fâcheux. D'où l'on peut conclure, que la ligature est préférable à l'incision dans la cure radicale des hernies -

~~Exemple~~ On a aussi guéri radicalement les hernies ombilicales par la ligature.

Cas. 3 = Une fille âgée d'environ vingt six ans vint à l'hôpital de Sainte Marie, le 1^{er} au mois de Février de l'année 1774. Elle étoit atteinte de plusieurs maladies, surtout un escorophale de la grosseur d'un œuf de poule. La malade ayant désiré d'en guérir radicalement, mon Père après avoir réduit les parties, lia le sac herniaire, et les ligamens auxquels il étoit joint, près du nombril. Il serva après pour intercepter la circulation. Les parties s'étant gangrenées, la ligature tombée, il n'y resta aucune ouverture au bas ventre, et la plaie qui succéda à la ligature, guérit en peu de temps. La malade partit de l'hôpital parfaitement guérie.

La cure radicale de la hernie assure l'homme du danger de perdre d'un moment à l'autre la vie à cause de l'étranglement de l'intestin. L'opération, ~~à la~~ qu'on pratique alors n'a pas toujours un bon succès. Elle est souvent inutile, lorsqu'on la fait trop tard, lorsqu'elle inflammation a produit le sphacèle des intestins, ou que l'étranglement est un effet de l'inflammation des intestins. Dans ce dernier cas quoiqu'on opère de bonne heure, on n'a point de succès. L'inflammation des intestins est souvent causée par des mauvaises nourritures qui produisent l'effet d'un poison à raison de la mauvaise disposition des premières voyes. L'air qui se dégage alors dans les intestins, et en plus grande quantité si les nourritures sont végétales, les pousse au dehors avec le péritoine, s'il n'y avait point de hernie, et forme l'étranglement comme le prouve l'observation suivante.

Obs. 4 = Pierre Tanti tailleur de Florence âgé d'environ cinquante ans, ressentit au ~~ventre~~...

commencement du mois de Juillet de l'année 1741. après avoir mangé des champignons, des vives douleurs dans l'abdomen avec gonflement. Le malade ayant porté par hasard une main sur l'aîne droite, il y trouva une tumeur.

M. Carloni Chirurgien d'un mérite distingué, ayant été appelé auprès de ce malade, lui reconnut une hernie avec étranglement. Les saignées, les bains, les fomentations, et autres remèdes généraux, n'ayant produit aucun soulagement, on consulta mon Père trois jours après. Le malade l'assura de n'avoir jamais aperçue aucune trace de hernie ~~avec~~ avant les douleurs, d'où l'on conclut, que cette hernie avec étranglement, étoit l'effet de l'inflammation causée par les champignons. Le malade ~~ne~~ desiroit l'opération, d'où il attendoit du soulagement. On s'y déterminâ difficilement, parceque l'inflammation étoit la cause, et non l'effet de la hernie. Il n'y

et dans les
intestins

avoit qu'une petite anse d'intestin ⁷
étranglé dans le sac herniaire. Les acci-
dens subsisterent malgré la réduction
de l'intestin. Le sphacèle survint,
et le malade mourut le lendemain de
l'opération. On pourroit penser, que si
on avoit opéré plutôt, on lui auroit
sauvé la vie, mais on verra par ~~les~~ les
observations suivantes, que dans ces cas
les malades meurent également, quoiqu'
on les opère de le premier jour de l'
étranglement.

Obs. 5 - François Chirici Florentin, âgé d'environ
vint cinq ans, fort, et vigoureux, étoit
attaqué de ~~enfant~~ d'une droite de puis
l'enfance, d'une petite descente
pour la quelle il ne portoit pas constam-
ment un bandage. Le matin de - 25 -
Janvier 1775 - après avoir mangé des
petits pâtés, il ressentit des vives dou-
leurs intestinales, accompagnées de gonfle-
ment à l'abdomen. Il ôta le trayer,
parce-qu'il en étoit gêné. L'intestin
sortit alors dans le sac herniaire. Je
fus mandé pour le voir. Il étoit

inquiet. Il avoit des fortes douleurs, et des
envies de vomir. La tumeur étoit de
la grosseur d'une noix. J'en tentai
en vain la réduction. D'après les
questions, que je fis au malade, je
reconnus, que l'étranglement de l'
intestin étoit l'effet de l'inflam-
mation produite par les mauvaises
digestions des alimens qu'il avoit
pris le matin. L'inflammation, la
douleur, et la tumeur augmentèrent
ainsi que la tuméfaction de l'abdo-
men. Les nausées, le hoquet, et le
vomissement devinrent fréquents;
ce qui me fit ~~porter~~ porter un mauvais
prognostic sur cette maladie. Il
fut saigné du bras le lendemain. On
lui donna des lavemens amolliens,
sans oublier les fomentations sur
l'abdomen, et sur la tumeur. ~~Initia~~
Instruit par l'observation ci-dessus,
et par des autres semblables, je
ne me déterminai à ~~l'~~ opérer le
malade, qu'après l'avoir prévenu
de peu de succès qu'on pouvoit

attendre de l'opération, je la fis le soir
de 10-Juillet 1745 - troisieme jour de la
maladie dans l'hôpital de Sainte Marie
Neuve, à la presence de mon Pere, et
~~de~~ plusieurs personnes. Le sac herniai-
re étoit rempli d'une eau sanglante.
L'intestin presque noir, étranglé par
l'anneau, que je débridai, ainsi qu'un
autre étranglement forme par le
sac herniaire, décrit par M. Arnaud,
et autres, et observé plusieurs fois
dans notre hôpital. Je réglai l'
intestin, et on pansa la plaie à l'
ordinaire. Il n'y eut point d'hémor-
ragie, quoiqu'il fallût faire des incisions
profondes pour débrider les étran-
glements. Nous ne fîmes pas tromper
dans notre attente. L'inflammation
augmentant, on craignoit une
mort prochaine. Le quatrième jour on
trouva ~~sur la~~ dans la plaie des
matieres hercorales. Au cinquieme
l'inflammation diminua. La
plaie suppura moins. Les matieres
hercorales passeroient en partie par

la plaie, et en partie par la voie natu-
relle p^r l'aide des lavemens, ou de
quelque purgatif. L'ouverture de l'intes-
tin se rétrécit peu à peu, et se ferma
peu de tems après, mais l'inflam-
mation réparoissant, détruisoit tout
ce qui étoit formé, et renouvelloit
l'ouverture de l'intestin qui ne fut
jamais parfaitement guéri. Enfin une
dernière inflammation produisit le
sphacèle, et le malade mourut quelques
mois après l'opération qui n'auroit
pas eues ~~les~~ suites fâcheuses si l'inflam-
mation eût été l'effet de l'étrangle-
ment, et l'ouverture de l'intestin
auroit pu se fermer, comme il est
arrivé dans l'observation suivante:

Obs. 6 = M^r l'Abbé Bracci de Florence, âgé d'
environ quarant'ans, portoit depuis
l'enfance une descente qui étoit sortie
plusieurs fois malgré le flayer, qu'il n'
avoit pas soin de tenir serrée après. On
l'avoit toujours réduite; mais le matin
le 6 - Novembre 1776 - étant à la

campagne, et à l'issue d'un grand repos, il
quitta le brayer qui l'incommodoit alors. L'
intestin ayant été poussé dans le sac her-
niaire, y resta étranglé. On mit le malade
dans son lit. On essaya en vain le tascis.
Les vomissemens, et les douleurs intestinales
ne tardèrent pas à survenir. Il passa la
nuit dans des inquiétudes continuelles.
Le lendemain de grand matin on appella
mon Père, qui avoit réduit la hernie les
autres fois. J'allai avec lui. L'étranglement
étoit considérable. La tumeur dure. & étoit
du malade dangereuse, et exigeant l'opéra-
tion, on le fit transporter à Florence, dont
il étoit peu distant. Il ne souffrit point
pendant le voyage. Ne dormit point la nuit.
Le vomissement, le hoquet étoient
fréquents, et la fièvre survint. Malgré les
saignées, et les autres remèdes, les signes
de l'inflammation ayant augmentés,
on le déterminâ à l'opération, que je
fis en présence de mon Père, et de M.
Lavere Manetti Docteur en Médecine, dont

L'habilité est très-connue. Il n'y avoit
presque point d'eau dans le sac herniaire
qui contenoit beaucoup d'épiploon, et
l'intestin qui étoit d'une couleur noirâ-
tre. Ayant incisé l'anneau, qui étoit
étroit, je replaçai l'intestin. J'emportai
l'épiploon qui étoit enflammé. Je ré-
duisis l'autre portion sans y faire
de ligature, ni la toucher avec les
instruments, instruit par plusieurs
opérations semblables faites dans
notre hôpital, et ailleurs, et où il n'
est presque jamais survenue d'hémor-
ragie. Je pansai la plaie à l'ordinaire.
Le malade passa une nuit tranquille.
Le vomissement, le hoquet, les douleurs
intestinales diminuèrent aussitôt après
la réduction de l'intestin. Il alla à
la selle ~~peu de temps~~ peu de temps
après. Le quatrième jour tous les signes
de l'inflammation disparurent. Le
sixième jour on trouva

20

pour la première fois sur la playe, des ma-
tières Stercorales. On continuâ de panser
avec la charpie sèche. L'ouverture de l'intes-
tin diminua peu à peu, et au bout de quelques
jours se ferma solidement, qui étoit ainsi
que la playe qui étoit guéri au bout de
deux mois lorsqu'il lui survint un abcès
au scrotum qui l'obligea de garder la chambre
pendant quelque jour. Il fut entièrement
guéri et de la hernie, et de cet abcès au
quatre vingt jours après l'opération.

On pourroit me reprocher de
n'avoir point emporté dans ce douse der-
nier cas la portion d'intestin qui par
sa couleur noirâtre paroît cancéreuse,
mais la couleur noire de l'intestin n'est
pas toujours un signe de gangrene, puisqu'
alors on l'a souvent réduit avec succès.
Si le malade de la cinquième observation
mourût, c'est que l'inflammation ne
dépendoit pas de l'étranglement, et d'
ailleurs est-on sûr que l'écoulement

continuel des matieres ne se seroit pas op-
posée à l'union des bouts de l'intestin.
On a fait plusieurs fois l'ampu-
tation d'une portion d'intestin avec
succès, ~~tant~~ dans notre hôpital, comme la
prouve l'expérience suivante.

Ob-1 = Un homme vigoureux le 20-Juillet-
1769 fut reçu dans cet hôpital attaqué d'
hernie avec étranglement. On l'opéra
aupitôt, parce que l'étranglement durait
depuis cinq jours. L'intestin étoit
gangrené. On débrida l'anneau, on tira
au dehors une plus grande portion
d'intestin, on en retrancha ~~sur~~ cinq
à six pouces qui étoient gangrenés.
Le bout supérieur fut introduit dans
l'inférieur et retenu par une suture,
et les bouts ~~des~~ des fils restèrent au dehors le
jour même de l'opération. Le malade
alla à la selle, le vomissement, le hoquet,
et tous les autres symptômes disparurent.
Le vingt-cinquième jour on tira facilement
le fils qui avoit servi à la suture.

11
Il ne sortit point de matière purulente,
et la plaie après une bonne suppu-
ration se cicatrisa, de sorte que le ma-
lade partit bien guéri le premier
Octobre 1769.

M.^r François Parranti habile Chi-
rurgien de Livourne en Toscane rappor-
te plusieurs exemples de pareilles
cures, dont on en trouve aussi des exem-
ples dans les Mémoires de l'Académie
Royale de Chirurgie de Paris, et en par-
ticulière dans le Savant Mémoire de
M.^r Loris - ainsi que dans les ouvrages
de Messieurs Arnaud, Sarracod, et autres.

L'écoulement d'une matière roussâtre,
ou d'autre couleur par la plaie, n'est pas
toujours une preuve, que l'intestin est ouvert,
comme on le voit par l'observation suivante.

1769 - M.^r Moggi Médecin Suisse âgé d'environ
vingt ans étoit depuis quelque tems dans l'
hôpital de Sainte Marie Neuve pour faire
des observations en Médecine. Il portoit
depuis long tems une tumeur molle au

Scrotum, qu'il venoit pour un hydroce-
le. Le soir de 25-Janvier 1777. en éternuant
l'intestin poussa dans le sac herniaire
s'y étrangla. Il commença sentir des
douleurs dans l'abdomen qui augmen-
terent peu à peu, on appliqua sur
la tumeur des fomentations emollien-
tes, mais la tumeur resta dans le
même état, et le malade passa la
nuit dans des agitations continuelles.
Le vomissement survint, ainsi que la
fièvre, et le hoquet, avec intermission
de ces symptômes. Le taxis ayant été
inutile, je lui fis l'opération le
second jour de l'étranglement & le
sac herniaire ne contenoit point
d'eau, mais une grande portion
d'ileon, et d'epiylon. L'anneau
étoit fort serré, et après l'avoir
détaché, je réduisis l'intestin qui
étoit enflammé, et emportai l'
epiylon parce-qu'il étoit affecté.
Je remplis le sac herniaire de

22
chirurgie sèche, et je terminai l'opération
à l'ordinaire. Bientôt après les matières
stercorales réjoindrent leurs cours natu-
rel. L'abdomen s'affaissa, les douleurs
diminuerent ainsi que le vomisse-
ment, et le hoquet. Il passa la nuit
tranquille. Le lendemain on trouva
sur la ~~plaque~~ le malade dans un meil-
leur état. On lui prescrivit des lave-
mens anodins. Il alla beaucoup à la
 selle. La fièvre continua encore quel-
que temps, et le troisième jour de l'opé-
ration on découvrit la plaie qui
était d'une bonne couleur. Vers le
sixième jour la plaie fut inondée
d'une matière rougeâtre presque
inodore, qu'on prit d'abord pour
matière stercorale, mais dans la suite
~~on eût de quoi s'assurer qu'elle ne~~
~~était pas cette matière car on~~
s'assura, qu'elle venoit de la
région iliaque, d'où on la faisoit
sortir par la compression, et où



le malade ressentoit des douleurs
lancinantes & la fièvre continuait avec
frisson. Le malade alloit aisement à
la selle & les matieres n'ayant ni l'
odeur, ni la couleur de celle qui sor-
toient par la playe, je conclus, que
celle-cy venoit d'un absces formé dans
la region iliaque entre le peritoine, et
les muscles comme on l'a d'ailleurs
observe plusieurs fois. Cet ecoulement
continua ^{environ} deux mois ainsi que la fièvre
On pansa la ~~playe~~ avec la charpie
seche, et la cicatrice s'est formée, et
au bout de dix semaines de l'operation
le malade jouissoit d'une parfaite
sante.

L'abus des medicamens, qu'on
employe pendant le traitement des
hernies operées, aussi bien que dans
les autres occasions, a plusieurs
inconveniens. Il peut troubler les
operations de la nature qui se suffit
presque toujours, d'ailleurs on ne

13
peut plus observer si exactement la
marche, ni distinguer ce qui est l'effet
de ses ressources, ni de l'usage des
médicaments. Il y a peu de cas où il soit
nécessaire, on peut cependant employer
les ~~lytiques~~ antiseptiques quand la
suppuration est purulente, les toniques
quand les bords de la plaie sont
trop relâchés, et les emollients seule-
ment quand les bords de la plaie
ne suppurent pas assez pour se
dégorger. La charpie sèche suffit en
beaucoup de cas.

Je craindrois d'ennuyer l'
Académie en lui communiquant
un grand nombre des détails, que
j'ai eû occasion d'observer plusieurs
fois sur les hernies. J'ai fâché dans
ce petit Mémoire de prouver l'
avantage de lier le sac herniaire
sur les autres moyens de guérir



radicalement les hernies. Je crois avoir
pourvu le danger des étranglemens
produits par l'inflammation, et l'
inutilité de les opérer. J'ai aussi fait
voir avec quelle prudence on doit
panser les plaies qui résultent de l'
opération de la hernie. Mon but
n'est point d'instruire les maîtres
de l'art consommés dans une longue
expérience, mais leur donner des
preuves de mon estime en leur
communiquant ce que j'ai vu dans
la pratique —